


Rapane

veiné - *Rapana venosa*



CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Coquille : ovale avec des lignes en pointillés blancs et noirs, spire courte surmontée de bosses prononcées, canal siphonal court et large

Ouverture coquille : lisse, brillante et de couleur **jaune-orangé intense**, bordée par une lèvre extérieure munie de **dents allongées**



MINKA
© viktor_parkhomenko CC BY-NC

SON HISTOIRE

Origine	1 ^{er} signalement	1 ^{er} signalement	Pas de signalement
Pacifique Nord-Ouest	Italie	France	En Espagne (Méditerranée)
	1974	2015	

Introduction via le trafic maritime ou ostréiculture

IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Le Rapane veiné affecte grandement les **écosystèmes benthiques côtiers**, notamment en raison de son régime alimentaire carnivore. Dépourvu de prédateurs naturels efficaces dans les eaux européennes (comme les étoiles de mer géantes de son aire d'origine), il entre en compétition avec les gastéropodes locaux et **perturbe la chaîne trophique**. Sur le plan économique, la prolifération de ce mollusque cause des **dégâts considérables à la conchyliculture**. Toutefois, dans certaines zones comme la Mer Noire ou en Asie, une **pêche commerciale** s'est développée pour sa chair très appréciée sur les marchés asiatiques.

LE PETIT PLUS

Propriétés **antioxydante, antimicrobienne et anticancéreuse**


Inflige une **suffocation chimique** à ses proies

Population en déclin dans son aire d'origine

ESPÈCE SIMILAIRE

Pourpre de la Méditerranée
Stramonita haemastoma

Espèce autochtone de Méditerranée



Signale ton observation

MINKA

BioObs

