



Caracol

venoso - *Rapana venosa*



CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN


Concha: ovalada con líneas **punteadas blancas y negras**, **espira corta** coronada por **protuberancias** pronunciadas y un **canal sifonal corto y ancho**

Apertura de la concha: lisa, brillante y de color **amarillo-naranja intenso**, bordeada por un labio externo con **dientes alargados**



MINKA
© viktor_parkhomenko CC BY-NC

SU HISTORIA



IMPACTOS ECOLÓGICOS Y ECONÓMICOS

El caracol venoso afecta en gran medida a los **ecosistemas bentónicos costeros**, especialmente debido a su dieta carnívora. Al carecer de depredadores naturales efectivos en las aguas europeas (como las estrellas de mar gigantes de su área de origen), compite con los gasterópodos locales y **perturba la cadena trófica**. Desde el punto de vista económico, la proliferación de este molusco causa **daños considerables en la acuicultura** de moluscos. Sin embargo, en algunas zonas como el Mar Negro o Asia, se ha desarrollado una **pesca comercial** porque su carne es muy apreciada en los mercados asiáticos.

EL DATO EXTRA

Propiedades **antioxidantes, antimicrobianas y anticancerígenas**


Población en declive en su área de origen

Provoca una **asfisia química** a sus presas

ESPECIE SIMILAR

Stramonita haemastoma

Especie autóctona del Mediterráneo



Comunica tu observación

MINKA

BioObs

