




Poisson-lapin

à queue tronquée - *Siganus luridus*



SON HISTOIRE



IMPACTS ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES

Siganus luridus exerce une **pression** sur les écosystèmes benthiques en rivalisant avec les **herbivores natifs** (comme les saupes ou les oursins). En grand nombre, il contribue à la **réduction des herbiers de posidonie**. Sur le plan économique, il est **peu exploité** commercialement en Méditerranée, mais il est **capturé accidentellement** par les filets de pêche côtiers et les palangres. Sa chair est comestible et appréciée dans certaines régions (notamment en mer Rouge), mais il peut présenter un risque de **ciguatera** dans certaines zones.

LE PETIT PLUS


Dans la liste des **100 espèces les plus envahissantes** en Méditerranée

CRITÈRES D'IDENTIFICATION

Forme du corps : **ovale** et latéralement **comprimée**, nageoire caudale **tronquée**, et nageoires dorsale et anale armées d'**épines venimeuses**.

Couleur : **brun foncé** au **vert olive sombre**, avec le bord des nageoires **jaunâtre**.

Dans les zones rocheuses ou la nuit, sa robe arbore un **motif marbré** :



MINKA © jmturon CC BY-NC

ESPÈCES SIMILAIRES


Poisson-lapin à ventre strié - *Siganus rivulatus*

Seule autre espèce du même genre présente en méditerranée, également non-indigène



Saupe - *Sarpa salpa*

Espèce native de Méditerranée



MINKA © xavi salvador costa CC BY-NC

Signale ton observation

MINKA



BioObs

